Existe una simple regla de oro que en el uso de la empresa “Curar la disfunción eréctil”, y es esto: Entre las edades de 20 y 45 años 70% de la disfunción eréctil o impotencia tendrá una causa psicógena; mientras que entre las edades de 60 años o superior a 70% de la disfunción eréctil será tener una causa fisiológica. O si desea simplificar esto aun más lejos que se podría decir que la mayoría de la disfunción eréctil en los hombres más jóvenes es causada por la ansiedad acerca de su desempeño mientras que la mayoría disfunción eréctil en los hombres de más edad es causada por factores físicos como el endurecimiento o sus arterias (arteriosclerosis) o descenso de su testosterona los niveles – el llamado síndrome de deficiencia de testosterona
En cualquier caso, es suficiente aquí para

hacer este punto:. Hay una gran diferencia entre el tipo de disfunción eréctil que los hombres jóvenes a obtener y el tipo de impotencia que el hombre mayor consigue. Por lo tanto, lógicamente, el mismo tratamiento no funciona para ambos grupos y que es la razón por la automedicación con medicamentos en línea para la disfunción eréctil es a menudo una pérdida de dinero y nunca una buena idea.

Si me pidieran que describa el hombre de más edad típica, viniendo a mi clínica o visitar mi página web en busca de ayuda para resolver su problema de disfunción eréctil, sería algo así:.

(a) el sería edades comprendidas entre los 65 y 75 años de edad

(b) a menudo se estaría en una segunda o nueva relación.

(c) Él estaría tomando medicamentos recetados para condiciones médicas no necesariamente relacionados con la disfunción eréctil.
(d) se habría tratado de Viagra o algún otro medicamento para la dE y decepcionado con los resultados.
(e) Es posible que tenga un historial de problemas de próstata o cirugía de la próstata como la RTUP.
(f) es muy posible que también tienen enfermedad arterial coronaria y / o diabetes tipo 2.
Obviamente, tal individuo necesidades de gestión especialista si alguna vez va a disfrutar de una relación sexual significativa de nuevo. Espacio aquí no me permite entrar en gran detalle más allá de hacer dos observaciones:. Simplemente

tirar Viagra o Cialis o Levitra en un hombre como la descrita anteriormente es mala medicina y se destine a tener resultados decepcionantes

Y en segundo lugar, ahora hay un creciente cuerpo de evidencia clínica de que los niveles bajos de testosterona pueden jugar un papel importante que contribuye en la causa de la disfunción eréctil en los hombres mayores. Por lo tanto, cuando sea apropiado, la terapia de reemplazo de testosterona o TRT pueden desempeñar un papel importante en la restauración de la función sexual satisfactoria. A menudo, cuando los medicamentos ED convencionales no logran generar una resolución, la adición de TRT puede hacer toda la diferencia.

Source by Andrew Rynne