

fármacos pertenecientes al grupo *inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina* (ISRS), tales como Lexapro, Celexa , Paxil, Zoloft, entre otros, se utilizan fundamentalmente para el tratamiento de la depresión y trastornos de ansiedad generalizada. Estos son medicamentos muy eficaces que actúan sobre la mayoría de los pacientes, y tienen pocos efectos secundarios graves en la mayoría de los casos. En una minoría de casos, sin embargo, los ISRS se han visto para ejercer efectos secundarios relativamente graves, uno de los cuales es la impotencia sexual. La impotencia es por lo general se manifiestan como los siguientes:

- Problemas de erección:
- incapacidad para lograr la erección
- incapacidad para mantener la erección

La eyaculación precoz

La anorgasmia (incapacidad para alcanzar el orgasmo)

La pérdida de la libido (deseo sexual)

El problema de la impotencia como efecto secundario de los ISRS cobra mayor importancia debido a la larga duración del tratamiento, que puede funcionar hasta varios meses o incluso un año o más. Pero, por suerte, dura sólo unas pocas semanas iniciales del tratamiento en la mayoría de los casos en los que la impotencia ha dado como resultado, que a su vez es un pequeño porcentaje del número total de casos

¿Por qué sucede la impotencia:. al parecer, esto tiene más que ver con menores no sexual efectos secundarios que afectan a los pacientes durante las primeras semanas de tratamiento. Como es,

los pacientes que toman un fármaco ISRS ya están sufriendo un estado de ánimo deprimido. Los no-sexuales efectos secundarios – que pueden incluir un aumento temporal de la depresión – que empeora el caso, y por lo tanto amortigua el deseo y / o rendimiento sexual

En los pocos casos en los que la impotencia se ha atribuido a un ISRS. , se vio que desaparece a las pocas semanas del inicio del tratamiento. En raros casos, sin embargo, la impotencia ha durado tanto como el propio tratamiento. En cualquier caso, sin embargo, los hombres afectados con este efecto secundario – casi sin excepción – fueron capaces de reanudar la vida sexual normal después de la finalización del tratamiento. Por lo tanto, la salvación se encuentra en la naturaleza

temporal de la impotencia resultante de un fármaco ISRS.

Por último, hay que decir que en el primer signo de la impotencia, los pacientes deben evitar el intento de relaciones sexuales hasta que se sientan realmente hasta eso. Un período temporal de la abstinencia es preferible a la depresión no tratada.

[Source](#) by [Sabyasachi Ganguly](#)