

Hay un error muy común que las infecciones por hongos sólo ocurren a las mujeres. Desafortunadamente, esto significa que a menudo una cura de la infección por Candida masculina ni siquiera se persiguió debido a un mal diagnóstico. Dado que los hombres se construyen diferente que las mujeres, que es mucho más difícil de detectar una infección por levaduras en los hombres. A menudo es el desarrollo de otros problemas de salud causados por la infección inicial por Candida que llama la atención a la infección real masculina de la levadura.

En muchos casos de infección por Candida masculina es que la pareja el macho tenía una infección por Candida y se lo dio a él. Si uno de los individuos en una relación tiene conocimiento de su ser diagnosticado

con una infección por candida y es tratado por un médico, el otro individuo en la relación también debe ser tratada. Si la hembra se prescribe una medicación anti-hongos para el tratamiento de la infección vaginal, a continuación, un medicamento anti-hongos también debe ser tomado como una cura de la infección de levadura masculina. De lo contrario, la pareja va a seguir pasando la infección de ida y vuelta. infecciones por Candida son más frecuentes con los hombres que beben cerveza. La levadura se permanecer en estado latente en el pene del varón y luego cuando entra en contacto con el canal vaginal que puede llegar a ser bastante activo. Algunas causas de las infecciones por Candida en los hombres incluyen la ingestión de las cosas con contenido de mohos incluso ligera,

como los antibióticos, el alcohol, la cebada, cacahuetes, productos de trigo, el sexo y los productos de maíz. Un sistema inmunitario debilitado puede ofrecer una mayor susceptibilidad. Si no se busca una cura de la infección por Candida masculina, la infección de la levadura puede viajar a través de la pared de la uretra del hombre y asentarse en su glándula prostática.

Hay algunas formas de determinar por su cuenta si tiene o no una infección por cándida. Una prueba casera es escupir un par de veces en una taza de agua a temperatura ambiente tan pronto como se levanta por la mañana. Una vez que han pasado quince minutos, compruebe el agua. Si su saliva se ha disuelto en el agua clara, entonces no tiene una infección por levaduras. Sin embargo, si sus sumideros

de saliva a la parte inferior mirando fibrosa es posible que usted necesita para buscar una cura de la infección de levadura masculina.

Los síntomas que podría experimentar un hombre cuando se sufre de una infección por cándida incluyen un poco de hinchazón, enrojecimiento y sensibilidad del pene y un olor a queso. Usted podría tener una descamación o materia blanca en la punta del pene y el prepucio. Cualquiera y todos los síntomas de una infección masculina de la levadura puede afectar a una vida sexual; Por lo tanto, un individuo que desee encontrar rápidamente una cura de la infección de levadura masculina eficaz. Si se descuida, una infección masculina de la levadura puede conducir a condiciones más serias tales como dificultad para orinar o la

impotencia.

El tipo de levadura que provoca infecciones por Candida es la levadura Candida. Desde la misma levadura causa infecciones por Candida femeninos como causas de los hombres, entonces el mismo tratamiento puede también ser utilizado. Las mujeres utilizan simplemente con el uso interno y la cura de la infección por Candida masculina es externa. medicamentos de venta libre, como Monistat puede ser utilizado por cualquier persona con una infección por levaduras.

La mejor manera para los hombres o mujeres para evitar contraer una infección por cándida es ser conscientes de las causas y mantenerse alejado de ellos en su dieta y sus actividades diarias.

[Source](#) by [Mike Gate](#)