

[ad_1]



La incapacidad de mantener una erección no se considera en la medicina una enfermedad

Por: Miriam Arvizu

Ciudad de México (Rasainforma.com).- La disfunción eréctil afecta a los varones mayores de 40 años, en 55 por ciento en forma leve, a 35 por ciento de manera moderada y al 10% en forma severa, afirmó el doctor Jesús Torres Aguilar, jefe del servicio de Urología del Hospital Juárez de México (HJM).

“Para no verse afectados en su autoestima, un gran porcentaje de quienes presentan impotencia sexual, se resisten a reconocerlo y a recibir tratamiento médico, lo que genera problemas en la relación de pareja o tensiones en el núcleo familiar.

Torres Aguilar, ofreció la conferencia sobre Fisiología de la Erección Peniana de la Disfunción Eréctil, en el Auditorio “Doctor Manuel Velasco Suárez” del HJM, dijo que según el doctor Mariano Sotomayor, coordinador de la Clínica de Disfunción Eréctil del Instituto Nacional de Nutrición, en el mundo hay alrededor de 152 millones de varones con disfunción eréctil, y esta cifra aumentará a 322 millones en el año 2025.

Explicó que hasta hace unos 30 años, en 80 por ciento de los casos se le atribuía un factor psicológico, y 20 por ciento orgánico. En la actualidad los porcentajes se invierten: 80% es orgánico y 20 por ciento psicológico.

La incapacidad de mantener una erección no se considera en la medicina una

enfermedad, ni siquiera un problema grave o una condición de riesgo para la salud del varón; pero sí una patología preocupante al llevar al hombre a una sensación de ansiedad, que le afecta física y emocionalmente”, explicó el galeno.

Expuso que problemas de estrés o de tipo angiológico y hormonales, pero sobre todo los estilos de vida –principalmente la mala alimentación y el tabaquismo-, son factores de riesgo de la disfunción.

Ante la comunidad médica, jefes de división, de servicio y residentes, encabezados por el Director General, Martín Antonio Manrique, insistió en que las personas que sufren de impotencia sexual dejen a un lado falsas creencias, mitos y tabúes que les impidan acudir al especialista, para recibir tratamiento

específico.

“Bien sea con medicamentos administrados vía oral, como Citrato Sildenafil, Vardenacilo o Tadalafilo; inyecciones o la colocación de bombas de vacío, para los casos leves o moderados; o por medio del implante peneano, en los casos severos, las personas que padecen esta situación pueden volver a sostener erecciones”, detalló.

El Jefe del Servicio de Urología del HJM indicó que la aparición de este tipo de medicamentos, a partir de 1988, cambió el panorama en la atención de pacientes con disfunción eréctil, con resultados exitosos.
[ad_2]

[Source link](#)