

disfunción eréctil súbita repentinos pueden hacer que un hombre sufren efectos psicológicos como la depresión, la ansiedad y la disminución de la sensación de valía. Emocional y físicamente se sientan cansadas y retraído. Se dice que el pensamiento negativo en relación con los comportamientos sexuales puede causar más de inferioridad al hombre que sufren de disfunción eréctil. Posiblemente, evitando todas las demás actividades y relaciones sexuales por completo, ya que piensan que son un fracaso.

Para los hombres, es muy importante para ellos mantener una erección ya; piensan que es la esencia de su virilidad.

Literalmente, de su forma de pensar, que es lo que les hace un hombre. Esta idea sólo hace que el asunto peor para la mayoría de

los hombres y puede conducir a sentimientos de descontento con la vida y sumar a sus problemas de presión y de salud. Por lo tanto, la mejor manera de lidiar con esto es tener una actitud positiva y nunca hundido en la depresión. Aceptar el hecho, de que tiene un problema y todo estará bien.

No son bien conocidas y las causas de la disfunción eréctil documentados y se pueden clasificar en dos divisiones: la psicológica y física.

El cerebro desempeña un papel fundamental en el desencadenamiento de una secuencia de acciones físicas que instigan una erección, desde el comienzo de la sensación de euforia sexual hasta la erección completa. Pero muchas cosas pueden interponerse en el camino de

sensaciones sexuales y que puede dar lugar a la disfunción eréctil.

Éstos son ciertas condiciones psicológicas que causan problemas de erección en hombres.

-Exhaustion O cansancio

-Apprehensions o ansiedad

-Depresión

-Estrés De trabajo y el hogar

-La falta de comunicación , y el desacuerdo con un compañero

Físicamente, hay muchos factores que causan este problema de disfunción y éstos incluyen:

1. Enfermedades y condiciones médicas tales como:

- riñón fracaso / hígado

enfermedades -neurological

esclerosis -multiple

-Diabetes

-heart la enfermedad, la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares

-Hipertensión

vasos sanguíneos -clogged

- trastornos de la próstata / cirugía

enfermedad de -Parkinson

trastornos -hormonal

2. Medicamentos para la otra problemas de salud como:

-anti-depresivos

- Medicamentos para la presión arterial

- Las pastillas para dormir

Consumo excesivo de tabaco, el exceso de alcohol (beber), y el abuso de drogas son también un factor que puede causar este problema. En ciertos casos, la disfunción eréctil significa un profundo médica problema / s. Por lo tanto, también se debe

tener cuidado y no asumir nada menos que, de haber tenido un chequeo con especialistas cualificados.

A pesar de que los aspectos psicológicos menudo anexan a los problemas de disfunción eréctil en todas las categorías de edad, las causas físicas resultan para obtener más habitual con la edad. En general, los factores psicológicos tienen un impacto brusco sobre este asunto que los factores físicos.

Por último, aquí están las listas de los hombres que están en alto riesgo de experimentar disfunciones eréctiles:

1. Los hombres comienzan a tener cambios en las funciones sexuales y pueden no experimentar la rigidez que una vez que tienen a medida que envejecen.
2. Los hombres con sobrepeso tienen el

doble de posibilidades de ser impotente que los hombres que tienen un peso normal.

3. Hay hombres que están tomando medicamentos para problemas de salud. Algunas recetas pueden afectar a la salud sexual.

4. Los hombres que tienen ciertas condiciones de salud y enfermedades.

5. Los hombres que se han sometido a algunas cirugías o han tenido lesiones que dañaron algunos nervios.

6. Los hombres que fuman y beben en exceso.

7. Los hombres que usan drogas prohibidas o se encuentran bajo consumo de sustancias ilegales.

8. Los hombres que viajan en bicicletas o motocicletas por un tiempo prolongado.

9. Los hombres que están deprimidas o

tienen trastorno de ansiedad.

Source by Kelly Purden