

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre ... pero como cada tío sabe, eso no es del todo cierto ... es su pene. El foco de mucha atención durante toda la vida y, sin duda, una fuente de placer sin fin, que es tu pequeño amigo íntimo que me quedo contigo en las buenas y en las malas. Pero su pene también puede ser una fuente de gran preocupación y la ansiedad - a partir de cómo se ve la forma en que funciona. A continuación encontrará cinco síntomas comunes que pueden afectar al pequeño descifrado y explicó; lo que debería ayudar a entender mejor su carácter complejo. De erecciones que no va a disminuir a lesiones que lo pueden dejar una parálisis permanente, así como la respuesta a esa vieja pregunta de si él realmente a la altura, el siguiente

‘Verificador de síntomas “debería ayudar a mantener su relación con su pene en la pista

Síntoma:. Usted ha desarrollado una curva significativa en su pene erecto ...

Causa: los penes de todas las formas y tamaños; y es bastante normal tener cierto grado de curvatura a la izquierda, derecha, arriba o abajo desde el nacimiento. Sin embargo, si el pequeño tío desarrolla una curva prominente durante la edad adulta, que bien puede estar sufriendo de una condición conocida como la enfermedad de Peyronie.

Peyronie se caracteriza por una acumulación de tejido cicatricial en la hoja de tejido (llamada túnica albugínea) que encapsula las cámaras de erección. Debido a que este tejido de la cicatriz (conocida

como placa) no es capaz de estirar con el resto de la túnica albugínea durante una erección, el pene se dobla en el punto de la acumulación de placa.

El grado de curvatura puede ser tan severa que impide la relación sexual; y es a menudo (pero no siempre) acompañado de erecciones dolorosas, así como un estrechamiento del cuerpo del pene en el punto del problema.

La causa de la enfermedad de Peyronie es objeto de un intenso debate. Un porcentaje de los casos se cree que es el resultado de un trauma menor del pene (que puede ser tan leve como para haber pasado desapercibido en el momento). Sin embargo, las incidencias no se elevan en los hombres en sus años 50 y 60, están a veces acompañada de otros trastornos del

tejido conectivo y puede incluso tener un vínculo genético

Tratamiento:. Debido al hecho de que la causa de muchos casos de la enfermedad de Peyronie sigue siendo un misterio, opciones de tratamiento médico son a menudo impredecible. Los médicos a menudo recomiendan suplementos orales de vitamina E como una primera opción de tratamiento de línea debido a la capacidad de la vitamina para reducir la formación de tejido cicatrizal en todo el cuerpo. En casos más severos medicamentos que ayudan al colágeno desglose (una proteína que se cree que juega un papel clave en el desarrollo de la enfermedad de Peyronie) se inyecta directamente en los tejidos afectados - pero de nuevo con diferentes niveles de éxito. La cirugía correctiva para

reducir la gravedad de la curvatura del pene se considera generalmente como un último recurso, ya que los diversos procedimientos quirúrgicos disponibles o bien tienden a causar cierto grado de acortamiento del pene o tienen un riesgo relativamente alto de causar mayores daños eréctil. Un estudio reciente publicado en la revista *Journal of Sexual Medicine* sugiere que la tracción del pene podría ofrecer una alternativa no quirúrgica viable para los hombres que han no han respondido a otras formas de tratamiento

Síntoma: a pesar de tener relaciones sexuales se oye un chasquido nauseabundo, seguido de dolor extremo, su erección se desinfla más rápido que un neumático soplado hacia fuera y su pequeño tío se convierte rápidamente negro y azul ...

Causa: Este escenario de pesadilla es causada por trauma repentino en el pene que resulta en una “fractura de pene ‘. Mientras que su pene contiene el mismo número de huesos como el molusco promedio (ninguno), el sonido de craqueo es un resultado de la túnica albugínea (la funda de tejido que cubre las cámaras de erección mencionados anteriormente) de división o el desgarró bajo la fuerza extrema.

violentemente doblar un pene completamente erecto es el culpable común - un error fácil de hacer durante los tiros de la pasión (sobre todo si está en la parte superior). Pero si lo peor sucede y se tiene en cuenta su otra mitad para ser culpable, no se espera ningún tipo de compensación monetaria -. Un hombre que trató de

demandar a su (no sorprendentemente ex) novia por eso mismo tenía su demanda por imprudencia temeraria despedidos

Tratamiento: pronta intervención

quirúrgica para reparar la túnica dañado es por lo general una necesidad. expertos no son tratadas, advierten que hay un 10 - . probabilidad del 50 por ciento de que usted sufra un daño irreparable que puede causar la deformación permanente al cuerpo del pene, dolor durante las relaciones sexuales y lo peor de todo, la pérdida permanente de la función eréctil

en honor a la verdad, sin embargo, no es probable que necesite mucho ánimo a apresure a a & e si alguna vez la mala suerte de experimentar la agonía adormecer la mente, la hinchazón y los moretones que suele acompañar a una

fractura de pene.

Síntoma: Mr Happy ha quedado más su bienvenida ...

Causa: Aunque una licencia perpetua erección podría sonar como diversión (detrás de las cortinas cerradas por lo menos), prestar atención, porque una erección que dura más de cuatro horas requiere atención médica urgente para evitar el daño permanente del pene.

Medicamente conocido como priapismo, erecciones involuntarias que se niegan a ceder puede ser causada por una serie de factores. En hombres sanos, las drogas ilícitas como la cocaína y la marihuana y el abuso de medicamentos contra la impotencia para fines recreativos son los culpables más comunes. La condición es también un efecto secundario conocido de

diversas enfermedades de la sangre como la anemia de células falciformes y la leucemia; e incluso puede ser un síntoma de la malaria ... que es algo que nunca se ve en esas viejas películas de la Segunda Guerra Mundial. Pero si le pasa a usted, no asuma que es el efecto secundario de algo más siniestro ... una erección incesante puede ocurrir sin razón explicable en tíos muy saludable.

Pero no tragarse el orgullo, obtener una sombrero para ocultar el infractor protuberancia anatómica y la pierna hacia abajo a la sala de emergencia tan pronto como sea posible

Tratamiento: por desgracia, las opciones de tratamiento para el priapismo involucran a todos los objetos de metal afilados que entra en la proximidad peligrosa a su

pequeño amigo. Pero estos son una necesidad para restablecer el flujo normal de la sangre con el fin de evitar daños en el tejido nervioso y permanente.

Opciones de primera línea incluyen inyecciones de un tipo de fármacos conocidos como agonistas alfa directamente en el cuerpo del pene. Estos ayudan a la arteria cavernosa del pene que se alimenta de sangre para contraher, que a su vez relaja los vasos sanguíneos que permiten que la sangre se escape. Como alternativa, (aquí es donde es posible que desee cruzar las piernas) una técnica llamada de riego cava consiste en la inserción de una aguja en el casco del pequeño soldado, a través del cual se bombea una solución salina para enjuagar la sangre atrapada. Si todo lo demás falla, un pequeño dispositivo

conocido como un “shunt” que se utiliza para redirigir el flujo de sangre se implanta quirúrgicamente en el pene.

Por supuesto, todo lo anterior se lleva a cabo en régimen de anestesia local o general .. Aunque naturalmente es posible que desee mirar hacia otro lado

Síntoma: sus erecciones parecen haber perdido su entusiasmo por la vida ...

Causa: erecciones Lacklustre pueden ser un síntoma de una multitud de problemas subyacentes, tanto emocional como físico. Todo lo que afecta a su bienestar mental, de la tensión diaria de depresión clínicamente diagnosticada puede dejar su pene un poco desinflada . Para empeorar las cosas, muchos de los medicamentos recetados para tratar estos trastornos enumerar la disfunción sexual masculina

como uno de sus efectos secundarios más comunes. Lo que es más, la automedicación con drogas recreativas e ilícitas del alcohol, a través de la marihuana y la cocaína todos pueden tener un efecto negativo similar sobre la calidad de su erección.

En cuanto a las causas físicas se refiere, desequilibrios hormonales y restringen la circulación de el pene son los dos culpables más probables -. pero ambos otra vez puede ser causada por una serie de causas físicas subyacentes

los desequilibrios hormonales como la testosterona baja puede ser el resultado de muchas cosas, incluyendo la falta de sueño, exceso de peso, la edad relacionados disminución o incluso daño a la glándula pituitaria causado por un golpe leve en la

cabeza (la de arriba de su cuello).

Debido a su tamaño relativamente pequeño, la arteria cavernosa que suministra el pene con la sangre es también a menudo el primera víctima de la aterosclerosis - el proceso por el cual las arterias se obstruyen gradualmente con depósitos de grasa. erecciones débiles, sobre todo en los hombres mayores de 40 años, por lo tanto, pueden ser el primer signo de la enfermedad cardiovascular, lo que obviamente objeto de nuevas investigaciones por su médico

Tratamiento: tratamiento Una vez más depende de la raíz del problema subyacente . El primer paso a su médico es probable que tome es para darle un examen físico completo para comprobar su salud cardiovascular y la pantalla de

desequilibrios hormonales. Si se encuentra en uno de los muchos medicamentos para la presión arterial anti-depresivo o alta que la lista de erecciones débiles como efecto secundario, estos pueden ser sustituidos o dosis cambiaron por algo más agradable erección. Muchos psicoterapeutas afirman que el asesoramiento puede ser eficaz cuando hay una causa psicológica subyacente - en particular para aquellos que sufren de "ansiedad de ejecución". Pero antes hay que bajar la raíz psicoterapia, que es por supuesto importante para descartar causas físicas -. Hay poco beneficio en la gran sensación de la psicoterapia si estás a punto de morir de un ataque al corazón. Lo más proactivo puede hacer como individuo para mejorar la calidad de sus

erecciones es mejorar la calidad de su estilo de vida. Las mejoras en su salud emocional y cardiovascular de ejercicio regular puede tener un efecto enorme erección impulsar. Del mismo modo, si usted fuma ... deja. Un reciente estudio sobre la relación entre la disfunción eréctil y los cigarrillos sugiere que hasta 1 de cada 5 casos se pueden vincular directamente a la costumbre. Limitar la cantidad de grasas saturadas en la dieta es otra obviedad para mantener las arterias en el pene claras de depósitos de grasa, mientras que la suplementación con vitamina C ayuda a mantener la integridad de las paredes arteriales. Linus Pauling, un científico ganador del Premio Nobel, era un firme creyente en los poderes de la vitamina C para mantener las arterias libres de la

enfermedad -. 500-1000mg lo que sugiere que se toma dos veces al día podría tener fuertes efectos protectores

Recuerde siempre ... todo lo que es bueno para las arterias también es bueno para el pene demasiado

Síntoma:. Su pequeño hombre es ... erm ... demasiado poco ...

Causa: a menos que su pene erecto medidas de longitud de menos de 7cm (2,75 pulgadas) que no se pueden clasificar en el sentido médico, al menos, por tener un pene muy pequeño. El 0,6 por ciento de los hombres que entran en esta categoría se denominan a sufrir de una condición llamada "micropene", que se cree que es causada por un desequilibrio hormonal en el útero durante las últimas etapas del desarrollo fetal.

De acuerdo los expertos, los que caen dentro del rango de tamaño “medio” pero que sin embargo experimentan ansiedad extrema o baja autoestima respecto a su tamaño del pene bien podría estar sufriendo de un trastorno psicológico reconocido dismorfofobia llamada del pene (también conocido por el nombre de un poco menos detallado de “síndrome del pene pequeño”). Al igual que con otros trastornos dismórficos cuerpo, la preocupación de la anomalía física percibida puede ser tan grave que afecta a todos los aspectos de la vida. dismorfofobia peneana se considera una condición crónica que a menudo no mejora sin psicoterapia. Pero lo que es normal? Bueno de acuerdo a un artículo publicado en la revista médica BJU International en 2007, es una longitud

del pene erecto de entre 5,5 y 6,3 pulgadas (14 - 16 cm) y una circunferencia erguida de entre 4,7 y 5,1 pulgadas (12 - 13 cm). En este estudio se basó sus conclusiones sobre la síntesis de 12 estudios anteriores en el tamaño del pene - lo que los resultados probablemente proporcionan un reflejo bastante exacto

Si usted es de tamaño medio y todavía no del todo feliz, sin embargo, no se preocupados ... usted no está necesariamente sufren de dismorfofobia peneana. El mismo estudio también concluyó que alrededor del 45 por ciento de los hombres sufren un grado de preocupación por su tamaño del pene. Los investigadores señalaron que los hombres tienen la costumbre de subestimar sus propias dimensiones del pene, mientras que

la sobreestimación de lo que es normal. Irónicamente, el estudio también encontró que el 85 por ciento de las mujeres eran, de hecho, satisfecho con el tamaño del pene de su pareja

Tratamiento: En las décadas pasadas, los desafortunada de ser diagnosticados con micropene en la infancia fueron a menudo “tratado” a través de la cirugía de cambio de sexo. En estos días, afortunadamente, el diagnóstico (de nuevo, por lo general hecha en la infancia) tiende a ser seguido por la terapia de hormona de crecimiento

Las víctimas de graves dismorfofobia peneana por lo general necesitan psicoterapia para mejorar la calidad de sus vidas.; y dicha terapia también a menudo se recomienda como primera opción de tratamiento de primera línea para los

hombres que están considerando procedimientos de ampliación quirúrgicos. Por supuesto, como se mencionó anteriormente, una insatisfacción general con el tamaño de su pene está lejos de ser anormal (es una insatisfacción compartido por casi la mitad de todos los hombres) - y como tal no significa que necesita ser tratado para la dismorfofobia peneana. Lo que es más, sobre todo en estos tiempos modernos, cuando los hombres están expuestos a los mismos medios de comunicación y las presiones sociales como las mujeres a tener el cuerpo perfecto, esta preocupación masculina con el tamaño del pene parece estar en alza (nunca mejor tipo de intención).

Numerosas formas quirúrgicas y no quirúrgicas de ejercitar sus miembros se

han promocionado en los últimos años -. aunque la mayoría no resisten un escrutinio pene cirugía de alargamiento se ha demostrado que es nominalmente efectiva, con estudios que sugieren que las ganancias de alrededor de una pulgada de longitud flácida y la mitad de una pulgada de longitud erguida se puede esperar de un procedimiento exitoso. Pero incluso con el perfeccionamiento constante de este tipo de técnicas de faloplastia ” en los últimos años, la mayoría de los organismos profesionales médicos siguen considerando que las recompensas no para justificar los riesgos.

[Source](#) by [Gary Marshall](#)